

Thomas Weatherby

Theo I: 6. Drehimpulserhaltung




Prüfungsfrage (MIT)

Problem 5: elliptic orbit

A satellite of mass m is in an elliptical orbit around a planet of mass m_p which is located at one focus of the ellipse. The satellite has a velocity v_a at the distance r_a when it is furthest from the planet. The distance of closest approach is r_p .

a) What is the magnitude of the velocity v_p of the satellite when it is closest to the planet?

b) If the satellite were in a circular orbit of radius $r_c = r_p$, is its velocity v_c greater than, equal to, or less than the velocity v_p of the original elliptic orbit? Justify your answer.




Frage 1: Bahnkurve eines Massenpunktes

Ein Massenpunkt bewegt sich auf folgender Trajektorie:

$$\vec{r}(t) = (a \cos(\omega t), b \sin(\omega t), ct)$$

1. Skizzieren Sie die Bahnkurve.
2. Bestimmen Sie das Potential U , unter dessen Einfluss sich das Teilchen der Masse m bewegt.
3. Bestimmen Sie die Gesamtenergie E des Teilchens.
4. Bestimmen Sie Drehimpuls und Drehmoment des Teilchens (bezogen auf den Ursprung) für $c = 0$.



Frage 2: Bewegung in einem allgemeinen radialsymmetrischen Potential

Ein Teilchen der Masse m bewege sich unter Einfluss des allgemeinen Zentralpotentials

$$U(r) = - \frac{c}{r^\lambda},$$

wobei $\lambda c > 0$, $\lambda \neq 0$ und zugleich $\lambda < 2$.

1. Wie lautet das zugehörige effektive Potential $U_{\text{eff}}(r)$
2. Finden Sie die Beziehung zwischen Radius und Drehimpuls, für die sich das Teilchen auf einer stabilen Kreisbahn mit Radius r_0 bewegt. Sie können ohne Beweis voraussetzen, dass $U_{\text{eff}}(r)$ bei geeigneten Energien gebundene Bewegungen erlaubt.
3. Zeigen Sie explizit, dass man für die Kreisfrequenz ω_0 eines Umlaufs auf dieser Kreisbahn folgenden Ausdruck erhält:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\lambda c}{m r_0^{\lambda+2}}}$$

Frage 3: Bewegung in einem speziellen radialsymmetrischen Potential

Ein Massenpunkt der Masse m bewege sich in folgendem Zentralpotential:

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r^2}, \quad \alpha > 0$$

1. Wie lautet die Energie E des Teilchens?
2. Unter welchen Bedingungen kann der Massenpunkt das Zentrum des Potentials ($r \rightarrow 0$) erreichen, wenn sein Drehimpuls $L \neq 0$ ist? Welche Besonderheit ergibt sich für den Fall $L^2 = 2m\alpha$?
3. Wir betrachten nun den Fall ins Zentrum eines Körpers, der sich zum Zeitpunkt $t = 0$ im Abstand $r(t = 0) = r_0$ befindet und keine Radialbewegung besitzt $\dot{r}(t = 0) = 0$. Sein Drehimpuls $L \neq 0$ erlaubt ihm, das Zentrum zu erreichen. Die Abkürzung $\lambda = -\frac{L^2 - 2m\alpha}{2m}$ kann hilfreich sein.
 - a. Berechnen Sie die dafür benötigte Zeit und weisen Sie damit nach, dass diese endlich ist.
 - b. Zeigen Sie, dass allerdings die Winkelgeschwindigkeit und auch die Geschwindigkeit des Teilchens für $r \rightarrow 0$ gegen Unendlich gehen.

Frage 4: Gravitationsfeld der Erde

Ein Körper der Masse m bewegt sich ausschließlich radial im Gravitationsfeld der Erde (Radius R , Masse M).

1. Wie lauten die Gravitationskraft und das Gravitationspotential, die auf den Körper im Abstand r vom Erdmittelpunkt wirken.
2. Geben Sie die Gesamtenergie des Körpers im Gravitationsfeld an. Die Anfangsgeschwindigkeit des Körpers in seinem Startpunkt auf der Erdoberfläche sei v_0 . Wie groß ist seine Geschwindigkeit v in Abhängigkeit des Abstandes r vom Erdmittelpunkt?
3. Wie groß muss die Anfangsgeschwindigkeit v_0 mindestens sein, damit der Körper das Gravitationspotential der Erde überwinden kann?
4. Wie lautet der Zusammenhang zwischen Gravitationskonstante G und der lokalen Gravitationsbeschleunigung g an der Erdoberfläche?
5. Die International Space Station kreist in einer Umlaufbahn ca. $d = 350$ km über der Erdoberfläche ($R = 6400$ km). Wie groß ist dort in etwa die lokale Gravitationsbeschleunigung g_{ISS} im Vergleich zu g auf der Erdoberfläche? Weshalb spricht man trotzdem von Schwerelosigkeit?